

GEBRAUCHSINFORMATION

Nystatin Dechra

100.000 I.E./ml

Suspension zum Eingeben für
Hauskaninchen, Kleinnager,
Frettchen oder Ziervögel,
Brieftauben und Terrarium-Tiere

**NAME UND ANSCHRIFT DES
PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS
UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES
HERSTELLERS DER FÜR DIE
CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST
PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER**

Dechra Veterinary Products

Deutschland GmbH, Hauptstraße 6 - 8,
88326 Aulendorf

Dechra Veterinary Products GmbH, Hintere
Achmühlerstraße 1a, 6850 Dornbirn, Österreich

**FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICHER HERSTELLER**

Biokanol Pharma GmbH, Kehler Straße 7,
76437 Rastatt, Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nystatin Dechra 100.000 I.E./ml Suspension
zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager,
Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und
Terrarium-Tiere

**WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE
BESTANDTEILE**

1 ml enthält:

Wirkstoff: 100.000 I.E. Nystatin

Sonstige Bestandteile: Saccharose

Gelbe Suspension mit Geruch und Geschmack
nach Himbeere.

ANWENDUNGSGEBIET(E)

Hefepilzinfektionen im Magen-Darmtrakt.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nystatin
oder einen der sonstigen Bestandteile des
Arzneimittels.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt. Falls Sie eine Nebenwirkung
bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die
nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist,
teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder
Apotheker mit.

ZIELTIERART(EN)

Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder
Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere.

**DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART
UND DAUER DER ANWENDUNG**

Schmackhafte Suspension zum
Eingeben.



Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen,
Ziervogel, Brieftauben und Terrarium-Tiere:
1 ml/kg Körpergewicht 2-mal täglich über
14 Tage vorzugsweise über schmackhaftes
Futter verabreichen oder mit einer Einmalspritze
in den Mund des Tieres eingeben.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE

ANWENDUNG

Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe
abdrehen.

Originalpackung mit 48 ml Suspension
(mit Dosierpumpe): 1 Hub entspricht 0,5 ml.
2 Hübe entsprechen 1 ml.

Flasche nach Entnahme verschließen.

WARTEZEIT(EN)

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der
Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder
aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.

Nach dem Öffnen 6 Monate haltbar.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis
und äußerer Umhüllung angegebenen
Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Für Tiere mit Diabetes mellitus ist der Gehalt
an Saccharose zu beachten.

**BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT
VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER
VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN
ERFORDERLICH**

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel
sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen
abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung
mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass
kein missbräuchlicher Zugriff auf diese
Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen
nicht mit dem Abwasser bzw. über die
Kanalisation entsorgt werden.

AT: Arzneimittel dürfen nicht über das
Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt
werden. Nicht verwendete Tierarzneimittel
oder davon stammende Abfallmaterialien
sind entsprechend den nationalen
Vorschriften zu entsorgen.

WEITERE ANGABEN

Originalpackung mit 48 ml Suspension in
einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe im
Faltkarton.

AT: Diese Arzneispezialität wird gemäß §
7 Abs. 4 AMG in den Verkehr gebracht und
ist nur für die in dieser Gebrauchsinformation
genannten Tierarten bestimmt.